

বৈকলন

ইয়েকেরফম

বৈকেরফম

মাঝেমাঝেই পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হয়?



আরও বাড়তে পারে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে যেমন হিপ, পা, পায়ের পাতা বা বাষ্পতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ফসফুসের ক্যাল্সের

ফসফুসের ক্যাল্সের কারণেও ব্যাক পেন হতে পারে। ব্যাক পেনের সঙ্গে ফসফুসের ক্যাল্সের অন্য কেনাও উপসর্গ লক্ষ করে থাকে। অবশ্যই ডাক্তারের দখন।

ফসফুসের ক্যাল্সের সাধারণত দুই

ধরনের হয় - নন স্লল সেল লাং ক্যাল্সের এবং স্লল সেল লাং ক্যাল্সের মতে, মুত্রাশের গভীরতম টিসুটে তিউমার বেড়ে গো খুই সাধারণ।

পিঠের অংশে ব্যথা সাধারণত মুত্রাশের ক্যাল্সের অন্যান্য লক্ষণে হতে পারে। ব্যাক পেন কেবলমাত্র এই সব সাধারণ কারণের জন্যই হয় না, এটি বিভিন্ন ক্যাল্সের কারণের অভিযন্তা হতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের ক্যাল্সের কারণে হতে পারে ব্যাক পেন। আমরা

সাধারণে পিঠে ব্যথা মনে করে এই

লক্ষণকে অতিকার ও গুরুত দিই না।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকে অবশ্যই ডাক্তারের কারণে হয়ওয়া উচিত। চুনুন জেনে নেওয়া ব্যাক, কেন কোন ক্যাল্সের কারণে হতে পারে, যা শরীরের অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে - ঘন ঘন প্রাৰ্ব, প্রস্তাৱে রক্ত এবং প্রস্তাৱের সময় ব্যথা বা ব্রগ্গ।

২) মেরদঙ্গের ক্যাল্সের লক্ষণগুলি হল - অসাধুতা,

দুর্বলতা, বাধ ও পায়ের অবস্থা খারাপ এবং প্যারালাইস।

৩) ফসফুসের ক্যাল্সের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে - কাশিতে রক্ত পড়া, ক্রমাগত শাস্কস্ট, দীর্ঘস্থায়ী কাশি। কাশি দুই বা তার মেশি সপ্তাহ থারেও থাকতে পারে।

মেরদঙ্গের ক্যাল্সের অন্যতম

প্রাথমিক লক্ষণ হল ব্যাক পেন।

সময়ের সাথে সাথে এই ব্যথা

তলপেটের একটি অঙ্গ মুত্রাশে,

যার মধ্যে প্রাথম সংষ্ঠিত থাকে।

পিঠের নিচের অংশে অসহ্য ব্যথা

বা ব্যাক হওয়া মুত্রাশের ক্যাল্সের অন্য কেনাও উপসর্গ লক্ষণ হতে পারে। ইয়েল মেডিসিনের মতে, মুত্রাশের গভীরতম টিসুটে তিউমার বেড়ে গো খুই সাধারণ।

পিঠের অংশে ব্যথা সাধারণত অ্যাভেজ ক্যাল্সের অন্যান্য লক্ষণে হতে পারে। যদি

মুত্রাশের ক্যাল্সের অন্যান্য লক্ষণগুলির পাশাপাশি পিঠের প্রচণ্ড ব্যথা হয়, তবে

অবিলেখ চিকিৎসা করানো উচিত।

মেরদঙ্গের ক্যাল্সের মেরদঙ্গের

কাপাস ব্যাক পেনের অন্যতম

কারণ হতে পারে, যদিও এটি খুই

জানান এবং দল প্রতিক্রিয়া

করে। এই ব্যথা মেরদঙ্গের এবং

কারণে হতে পারে, যা শরীরের অন্যান্য

কাশিতে রক্ত পড়া, ক্রমাগত

শাস্কস্ট, দীর্ঘস্থায়ী কাশি। কাশি

দুই বা তার মেশি সপ্তাহ থারেও

থাকতে পারে।

আপনার শিশুকে দীর্ঘ সময় ডায়াপার পরিয়ে রাখলে যে ক্ষতি হয়



এসব ডায়াপার ব্যবহারে শিশুর সেমিসিপ্টি ভক্তে ক্ষতি হয় এবং

অ্যালার্জি হতে পারে তাই, এমন

ডায়াপার ব্যবহারের কর্ম যা অভ্যন্ত

নরম এবং স্লিপ-ফ্রেজল উপকরণ

দিয়ে তৈরি। স্লিপ-ফ্রেজল উপকরণ

মেরদঙ্গের পরিমাণ করে।

মেরদঙ্গের ক্যাল্সের কারণে হতে

পারে। ডায়াপার পরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিঠের ফাইবার ক্ষতি হতে

পারে। ডায়াপার তৈরি হতে পারে।

শিশুর ডায়াপার পরিবর্তন থাকে।

